

# DICOPUR D

A DOUA DENUMIRE COMERCIALĂ PRODATE REDOX

## ERBICID FENOXI



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 1783/13.03.1997

CULTURA:

**PORUMB  
GRÂU**

**600**

CONȚINE:

G/L ACID 2,4 D

TIMP DE PAUZĂ:



30  
ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



TERMEN DE  
VALABILITATE

TEMPERATURA  
DE APLICARE

FORMULARE:

CONCENTRAT SOLUBIL  
(SL)



ÎNTRU  
15° ȘI  
25°C

## MOD DE ACȚIUNE

**Dicopur D** este un erbicid sistemic, de tip hormonal, care se absoarbe prin frunze și, parțial, prin rădăcini. Erbicidul determină o creștere anormală a celulelor, inhibă respirația și dezvoltarea sistemului radicular al buruienilor.

Viteza de translocare a erbicidului este în funcție de doza aplicată, talia buruienilor și, în mod special, de condițiile climatice (umiditate, temperatură) înainte și după tratament.

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZA DE APLICARE (L/HA)
GRÂU	Buruieni dicotiledonate anuale și perene, sensibile la 2,4 D: <i>Chenopodium album</i> ( <b>Spanac sălbatic</b> ), <i>Capsella bursapastoris</i> ( <b>Traista ciobanului</b> ), <i>Thlaspi arvense</i> ( <b>Punguliță</b> ), <i>Atriplex spp.</i> ( <b>Lobodă sălbatică</b> ), <i>Raphanus raphanistrum</i> ( <b>Ridiche sălbatică</b> ), <i>Urtica spp.</i> , <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Sonchus oleraceus</i> ( <b>Susai</b> ).	<b>1 l/ha</b> se aplică, postemergent, primăvara de la stadiul de 3 frunze până la sfârșitul înfrățitului. (BBCH 13-29)
PORUMB	Buruieni dicotiledonate anuale și perene, sensibile la 2,4 D: <i>Chenopodium album</i> ( <b>Spanac sălbatic</b> ), <i>Cirsium arvense</i> ( <b>Pălămidă</b> ) – MS ( <i>Mediu sensibilă</i> ), <i>Convolvulus arvensis</i> – MS, <i>Polygonum sp.</i> – MS, <i>Stellaria</i> ( <b>Rocoină</b> ) – MS.	<b>1 l/ha</b> postemergent, de la stadiul de la 3 până la 6 frunze (BBCH 13-16)



# DICOPUR D

## TEHNICA DE APLICARE



**DICOPUR D se aplică în postemergență, în vegetație, pe vreme calmă, când temperatura este de 15°C.** La grâu se aplică de la stadiul de 3 frunze până la sfârșitul înfrățitului (BBCH 13-29). La porumb, administrarea erbicidului se va face primăvara când plantele de porumb au 3-6 frunze, iar buruienile sunt în stadiul de rozetă - Cirsium arvense (Pălămidă) < 10 cm. Cantitatea de soluție recomandată a se aplica pe suprafața de un hectar este de 200 – 300 litri. În condiții de secetă se aplică **400 l soluție/ha**.

## BURUIENI COMBĂTUTE

<b>A</b>	<i>Amaranthus retroflexus</i> ( <b>Știr</b> ) <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ( <b>Ambrozie</b> ) <i>Artiplex spp.</i> ( <b>Lobodă sălbatică</b> )	<b>P</b>	<i>Plantago lanceolata</i> ( <b>Pătlagină</b> ) <i>Polygonum aviculare</i> ( <b>Ardeii broaștei</b> )
<b>C</b>	<i>Capsella bursa pastoris</i> ( <b>Traista ciobanului</b> ) <i>Centaurea cyanus</i> ( <b>Albăstriță</b> ) <i>Chenopodium album</i> ( <b>Spanac sălbatic</b> ) <i>Cirsium arvense</i> ( <b>Pălămidă</b> )	<b>R</b>	<i>Raphanus raphanistrum</i> ( <b>Ridiche sălbatică</b> ) <i>Rumex acetosa</i> ( <b>Măcriș</b> )
<b>E</b>	<i>Erigeron canadensis</i> ( <b>Bătrâniș</b> )	<b>S</b>	<i>Senecio vulgaris</i> ( <b>Spălăcioasă</b> ) <i>Solanum nigrum</i> ( <b>Zârnă</b> ) <i>Sonchus arvensis</i> ( <b>Susai</b> ) <i>Stellaria media</i> ( <b>Rocoină</b> )
<b>G</b>	<i>Galeopsis spp.</i> ( <b>Lingurica</b> )	<b>T</b>	<i>Thlaspi arvense</i> ( <b>Pungulița</b> )
<b>H</b>	<i>Helliantus annuus</i> ( <b>Samulastră de floarea soarelui convențională sau rezistentă la erbicidele din clasa imidazolinone sau sulfonitree</b> )	<b>V</b>	<i>Vicia spp.</i> ( <b>Măzărice</b> )
		<b>X</b>	<i>Xanthium spp.</i> ( <b>Cornaci</b> )

## ROTAȚIA CULTURILOR

În condiții climatice normale nu există restricții în rotația culturilor.

În condiții normale de umiditate produsul persistă în sol 1 – 4 săptămâni

