

Cabrio® Top

5% piraclostrobin + 55% metiram



Date tehnice

Formulare: Granule dispersabile în apă
Număr certificat omologare: nr. 001PC/6.11.2009
Ambalaj: 1 kg



Caracteristici și mod de acțiune

Cabrio® Top este un fungicid cu două substanțe active pentru combaterea bolilor la vița de vie și tomate.

Piraclostrobin, din grupa strobilurinelor, inhibă respirația mitocondrială a patogenilor prin blocarea transportului de electroni la nivelul centrului de oxidare a hidrochinonelor din citocromul bc1 (complexul III). Această inhibare blochează producerea de energie; patogenul moare.

Metiram este o substanță activă de contact, multi-site, din grupa ditiocarbamați.


Cabrio® Top are o puternică acțiune preventivă: inhibă mobilitatea zoosporilor, împiedică germinarea sporilor și dezvoltarea hifelor.

Prezența particulelor (depozitului) de produs la suprafața frunzelor permite redistribuirea cu ocazia perioadelor de reumectare a vegetației. Astfel, se asigură o protecție de încredere și uniformă a masei vegetative datorită mișcării translaminare și a sistemiei locale a substanței active piraclostrobin.

Astfel, Cabrio® Top prezintă, mai întâi de toate, proprietăți de contact (preventiv), fiind puternic legat de cuticulă. Migrează apoi în câteva minute către partea opusă a frunzei, grație mișcării translaminare. În final, Cabrio® Top se redistribuie sistemic local în frunză.



Aceste proprietăți determină o rezistență puternică la spălare (produsul asigură protecție sigură la apariția precipitațiilor survenite la o oră de la aplicarea tratamentului) și persistența efectelor.

Piraclostrobin formează inițial un depozit pe suprafața frunzei, puternic legat de cuticulă și rezistent la spălare



O parte din substanța activă migrează în doar câteva minute spre partea dorsală a frunzei datorită mișcării translaminare

În final, se redistribuie în frunză datorită sistemicității locale



Excelentă protecție împotriva bolilor

Cabrio® Top

5% piraclostrobin + 55% metiram

Cabrio® Top are și un efect fiziologic, vitalizant asupra plantelor. Plantele de viță de vie tratate cu Cabrio® Top au o culoare verde mai intensă comparativ cu plantele tratate cu produse standard.

Acest lucru face ca frunzele să fie mai sănătoase, cu o asimilație îmbunătățită și influență pozitivă asupra producției cantitative și calitative.

Beneficii AgCelence® la cultura viței de vie


Efect de înverzire și creșterea nivelului de clorofilă din frunze. Efectele fiziologice sunt determinate de faptul că produsul, prin modul său biochimic de acțiune, influențează, printre altele, și enzima care controlează sinteza fitohormonală a etilenei. Astfel, experimental, s-a stabilit că frunzele tratate cu Cabrio® Top produc cu până la 80% mai puțină etilenă și, de asemenea, o degradare redusă a clorofililor. Această scădere de etilenă întârzie îmbătrânirea și prelungeste activitatea fotosintetică, ceea ce înseamnă o producție mai mare de hidrocarbonați.

La cultura de tomate, Cabrio® Top combate mana, făinarea, pătarea albă, pătarea cafenie, alternarioza. În plus, contribuie la obținerea unor producții de foarte bună calitate.

S-au remarcat efecte fiziologice remarcabile în cazul culturii de tomate tratate cu Cabrio® Top:

- durată prelungită de păstrare a fructelor
- fermitate deosebită a fructelor
- conținut crescut în zaharuri

Efectul asupra calității recoltei



Modul de folosire

Cultura	Spectrul de combatere	Doză
Viță de vie (struguri pentru vin)	<p>Mana (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Făinarea (<i>Uncinula necator</i>)</p> <p>Putregaiul negru (<i>Guignardia bidwellii</i>)</p> <p>Escorioza (<i>Phomopsis viticola</i>)</p>	1,5-2 kg/ha
Tomate	<p>Mana (<i>Phytophthora infestans</i>)</p> <p>Făinarea (<i>Leveillula taurica</i>)</p> <p>Pătarea albă (<i>Septoria lycopersici</i>)</p> <p>Pătarea cafenie (<i>Cladosporium fulvum</i>)</p> <p>Alternarioza (<i>Alternaria solani</i>)</p>	1,5-2 kg/ha



Aplicare / momentul aplicării

Vița de vie - Cabrio® Top se poate utiliza pe toată perioada de sensibilitate a viței de vie față de aceste boli. Totuși, polivalența și eficacitatea sa sporită sunt puse în valoare cu precădere în stadiile din perioada înfloritului (în mod special în stadiul de sfârșit de înflorit) până în perioada de creștere a boabelor. Cabrio® Top trebuie aplicat preventiv.

În general, intervalul dintre tratamentele pentru combaterea bolilor cu Cabrio® Top este de 14 zile; intervalul dintre tratamente va fi redus la 10 - 12 zile în cazul în care presiunea de infecție este ridicată.

Tomate - Se recomandă aplicarea produsului după ce fructele au început să se formeze, în alternanță cu alte produse.

În urma studiilor efectuate în România, au rezultat următoarele recomandări suplimentare privind aplicarea Cabrio® Top la plantațiile de viță de vie:

- Plantații tinere - le conferă vigoare și limitează infectarea vițelor cu ciuperci ale lemnului în timpul numeroaselor operațiuni în verde și uscat
- Plantații pe rod - poate fi folosit în perioadele de creștere intensă a lăstarului și a boabelor
- Conferă plantației vigoare, iar fenomenul de “înverzire” este foarte evident.

Timp de pauză: Viță de vie - 35 de zile; tomate - 7 zile.

Volumul de apă: se recomandă 1000 l/ha - în funcție de echipamentul de stropit utilizat.

Notă: Se pot efectua max. 3 tratamente pe sezon (max. 2 consecutive), incluzând și alte produse care conțin strobilurine. Strobilurinele nu vor depăși 30% din numărul total al tratamentelor. Se va evita ca soluția de stropit să ajungă pe alte suprafețe sau culturi.



Avantaje

- Produs care combină spectrul extrem de larg și durata lungă de combatere a bolilor.
- Soluție pentru combaterea simultană a mai multor boli.
- Puternică acțiune preventivă și durată lungă de protecție.
- Efecte fiziologice remarcabile (produs din gama AgCelence®): plantele au o toleranță mai mare la stres (de ex., la vița de vie s-a observat o mai bună recuperare după grindină) și se observă un efect de înverzire.
- Obținerea unor producții de foarte bună calitate.