

## **GLOBAZTAR®**

**Conține:** azoxystrobin 250 g/l

Methyl (2E)-2-(2-([6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy)phenyl)-3-methoxyacrylate

Omologat cu certificatul de omologare nr. 224PC/ 20.10.2016

Fungicid

**Formulare:** suspensie concentrată



**ATENȚIE**

### **Fraze de pericol**

H302 – Nociv în caz de înghițire.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### **Fraze de precauție:**

P 260 - Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/spray-ul.

P 273 – Evitați dispersarea în mediu.

P 391 - Colectați scurgerile de produs

P 501 - Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

Spe3 – Pentru protecția organismelor acvatice respect și o zonă tampon netratată de 15m până la apa de suprafață.

**Conține: X x L**

**Lot nr:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Data fabricației:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Termen de valabilitate:** doi ani de la data fabricației

**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înainte de utilizare

**Producător și deținător al omologării:** Globachem NV, Belgia

**Distribuitor:** SC Belchim Crop Protection România SRL, Str. Ceasornicului nr. 3-7, Etaj.2, Ap. 9 București, Sector 1, Cod poștal 014111, Tel. 0371 353 545, e-mail: office-ro@certisbelchim.com

**În atenția dumneavoastră:** Respectând indicațiile din etichetă fungicidul GLOBAZSTAR poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Autorității Naționale Fitosanitare, Oficiilor Fitosanitare Județene sau firmei Belchim Crop Protection România.

## GLOBAZTAR®

**Conține:** azoxystrobin 250 g/l

### Fungicid

**Proprietăți fizico-chimice:** se prezintă sub formă de suspensie concentrată (SC), de culoare albă până galben-portocaliu.

### Mod de acțiune:

GLOBAZTAR este un fungicid sistemic, translaminar din grupa strobilurinelor cu acțiune preventivă și curativă împotriva bolilor din culturile de cereale paioase. Inhibă respirația fungilor, împiedică germinarea sporilor, creșterea miceliului și sporularea. Asigură o foarte bună combatere a bolilor și are și un efect de înverzire ce duce la o prelungire a vegetației cu efect direct asupra producției și calității acesteia.

### Spectrul de activitate și mod de folosire:

GLOBAZTAR se utilizează la culturile și în dozele conforme cu cele din tabel:

CULTURA	SPECTRUL DE COMBATERE	DOZA
Grâu	Septorioza - <i>Septoria tritici</i> Rugina galbenă - <i>Puccinia striiformis</i> Rugina brună - <i>Puccinia recondita</i> Septorioza spicelor de grâu - <i>Septoria nodorum</i> Boli ale spicului - <i>Cladosporium</i> , <i>Alternaria</i> Reduce severitatea atacului de Înnegrirea bazei tulpinii și rădăcinii plantelor de grau - <i>Gaeumannomyces graminis</i>	1 L/ha
Orz	Pătarea reticulară a frunzelor - <i>Pyrenophora teres</i> Rugina brună - <i>Puccinia hordei</i> Făinarea – <i>Erzsiphe graminis hordei</i> control moderat Reduce severitatea atacului de Înnegrirea bazei tulpinii și rădăcinii plantelor de grau - <i>Gaeumannomyces graminis</i> Reduce atacul de Arsură a frunzelor - <i>Rhynchosporium secalis</i>	1 L/ha
Secară Triticale	Rugina brună - <i>Puccinia recondita</i> Făinarea – <i>Erzsiphe graminis</i> control moderat Reduce severitatea atacului de Înnegrirea bazei tulpinii și rădăcinii plantelor de grâu - <i>Gaeumannomyces graminis</i> Reduce atacul de Arsură a frunzelor - <i>Rhynchosporium secalis</i>	1 L/ha
Ovăz	Rugina coronată - <i>Puccinia coronata</i> Făinarea – <i>Erzsiphe graminis avenae</i> control moderat	1 L/ha

**Momentul aplicării:** tratamentele se vor efectua preventiv sau în stadiile foarte incipiente de dezvoltare a bolilor. Pentru boli ale spicului (*Cladosporium*, *Alternaria*) se va aplica la înspicat. Aplicat la primul sau al doilea nod reduce severitatea atacului de înnegrirea bazei tulpinii și rădăcinii plantelor de grâu. Pentru combaterea tuturor celorlalte boli foliare se poate aplica de la primul nod și până la faza de formare a bobului, când conținutul acestuia este apos (BBCH 71). Se pot face maximum 2 aplicări pe an în vederea prevenirii apariției formelor de rezistență.

**Pregătirea soluției:** se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

**Tehnica de aplicare:** Se pot folosi echipamente specifice pentru aplicarea fungicidelor în culturile sus menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat poate fi de 200-300 l/ha, funcție de densitatea culturii. Produsul trebuie întotdeauna aplicat în amestec cu un produs destinat aceleiași ținte, dar din altă clasă chimică. Se recomandă în amestec cu clorotalonil, tebuconazol și alți triazoli.

**Compatibilitate:** GLOBAZTAR este în general miscibil cu alte fungicide și insecticide. Se recomandă consultarea tabelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandată utilizarea integrală a amestecului imediat după pregătire.

**Timp de pauză:** 35 zile

**Curățarea echipamentului:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**Măsuri de igienă și protecția muncii:** În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separat hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului.

**Măsuri de prim ajutor:** nu se va administra nimic pe cale orală unei persoane care nu este conștientă. Dacă victima nu se simte bine, se va solicita ajutor medical.

Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și permiteți victimei să se odihnească.

- după ingerare: trebuie chemat imediat medicul, nu induceți voma. Clătiți gura cu apă și nu administrați nici o substanță. Mențineți victima în stare de repaus. Sunați imediat la doctor.

- după contactul cu pielea: a se îndepărta imediat hainele atinse de produs. Spălați imediat cu apă și săpun clătind din abundență, apoi clătiți cu apă caldă

- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultați medicul dacă durerea, roșeața și lăcrimarea persistă.

- indicații pentru medic: tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

**Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

**Tratament simptomatic.**

**Măsuri de protecția mediului:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Se va respecta o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211-număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.



**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** mijloace de stingere corespunzătoare: spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată, spray de apă sau nisip. Mijloace neadecvate nu se va folosi un jet puternic de apă. Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Folosiți echipament de protecție. Trebuie folosită masca de protecție respiratorie. Trebuie asigurată o aerisire suficientă. Lichidul trebuie restrâns cu ajutorul materialelor absorbante materiale solide inerte (nisip, silicagel, liant de acid, liant universal). Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeuri speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** Nu lăsați la îndemâna copiilor. Păstrați produsul în recipientul original, închis ermetic într-un loc sigur, bine ventilat, departe de hrană, fertilizanți, băuturi. Se va păstra ferit de căldură și de acțiunea soarelui. Se va păstra în spații care să permită menținerea unei temperaturi de 0°-30°C.

**Termen de valabilitate:** în condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de doi ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, fungicidul GLOBAZTAR poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Autorității Naționale Fitosanitare, Oficiilor Fitosanitare Județene sau reprezentanței Belchim Crop Protection România Tel. 0371 353 545.

**Număr internațional** care poate fi apelat în caz de urgență: +32 (0) 14 58 45 45. **Număr național** pentru cazuri de urgență: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil permanent, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.

**UFI: DA20-T05U-6001-PSJT**