

**Detalii Produs**

<b>Nume produs :</b>	KENJA
<b>Stare :</b>	Omologat
<b>Grupă de toxicitate :</b>	4
<b>Comentariu (motiv retragere) :</b>	
<b>Tip formulare :</b>	SC - Suspensie concentrata
<b>Categorie :</b>	1. Fungicide
<b>Clasă :</b>	G. Amine, amide
<b>Număr cerere, dată:</b>	265133, 10/02/2016
<b>Număr certificat, dată:</b>	548PC, 20/11/2019
<b>Data expirare certificat:</b>	15/09/2027
<b>Detinator(i) omologare:</b>	ISK Biosciences Europe N.V., Belgia

**Substanțe active**

<b>Nume substanță :</b>	<b>Valoare</b>	<b>u.m.</b>
isofetamid	400	g/l

**Fraze de risc și siguranță**

<b>Frază</b>	<b>Categorie</b>
--------------	------------------

**Utilizări**

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Asmatui (camp si spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Busuioc	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Busuioc (sera)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Cais	Boli	Monilinia laxa (Monilioza)	0,9 L/ha Se aplica preventiv, la riscul infectiei in stadiile BB	-	-
Capsun	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	1,2 L/ha Se aplica preventiv, la riscul aparitiei infectiei	1 zi	-
Ceapa de tuns	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Ceapa de tuns (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
cimbru	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Cimbru (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Cires	Boli	Monilinia laxa (Monilioza)	0,9 L/ha Se aplica preventiv, la riscul infectiei in stadiile BB	-	-

Dafin (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Iarba grasa	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu)	1,0 L/ha Se aplica preventiv, la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Mangold	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu)	1,0 L/ha Se aplica preventiv, la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Patrunjel (camp si spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Prun	Boli	Monilinia laxa, Monilinia fructigena (Monilioza)	0,9 L/ha Se aplica preventiv, la riscul infectiei in stadiile BB	7 zile	-
Rapita	Boli	Sclerotinia spp. (Putregaiul alb)	0,8 L/ha (Se aplica in stadiile BBCH 60-65 (de la inceputul infl	-	-
Rozmarin	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Rozmarin (spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Salata verde (camp si spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Salvie	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Salvie (sera)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Spanac (camp si spatii protejate)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu)	1,0 L/ha Se aplica preventiv, la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Tarhon	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Tarhon (sera)	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	1,0 L/ha Se aplica preventiv la riscul aparitiei infectiei	21 zile	-
Vita de vie	Boli	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuziu)	1,5 L/ha Se aplica preventiv, la riscul infectiei	21 zile	-

in stadiile BB

**MRL**

Definiție Reziduuri

Produs Vegetal

MRL