

MYSTIC TOP

FUNGICID



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2626 /06.04.2006

CULTURA:

MULTIPLE

250

CONȚINE:

G/L TEBUCONAZOL

TIMP DE PAUZĂ:



14-56
ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



TERMEN DE VALABILITATE

FORMULARE:

EMULSIE DE TIP ULEI

ÎN APĂ (EW)



MOD DE ACȚIUNE

Mystic Top este un fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune, în special asupra agenților patogeni care provoacă făinări la culturile de grâu, orz, măr și viță de vie. **Mystic Top** are acțiune preventivă, curativă și uneori de eradicare, care se manifestă asupra patogenilor prin inhibarea sintezei ergosterolului, un component al membranelor celulare ale organismelor fîntă.

Utilizat în tratamente foliare, produsul este rapid absorbit de plantă și circulă ascendent prin sistemul circulator, protejând frunzele și creșterile noi.

Are o bună acțiune reziduală care se manifestă pentru o perioadă îndelungată, în funcție de cultură și de condițiile locale.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:

| CULTURĂ | AGENȚI PATOGENI | DOZA DE APLICARE (L/HA) | TIMP DE PAUZĂ (ZILE) |
|---------|--|-------------------------|----------------------|
| GRĂU | Complex de boli foliare (<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Septoria tritici</i> , <i>Puccinia spp.</i>) | 0.5 L/HA | 42 |
| ORZ | Complex de boli foliare (<i>Erysiphe graminis</i> f. sp. hordei, <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i>) | 0.5 L/HA | 42 |
| RAPIȚĂ | Putregaiul uscat (<i>Phoma lingam</i>), putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>), alternarioza (<i>Alternaria brassicae</i>), făinare (<i>Erysiphe communis</i>) | 1.0 L/HA | 56 |





MYSTIC® TOP

| CULTURĂ | AGENȚI PATOGENI | DOZA DE APLICARE (L/HA) | TIMP DE PAUZĂ (ZILE) |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| MĂR | Făinare (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 0.05% (0.750 L /ha în 1500 L apă) | 14 |
| VIȚĂ DE VIE | Făinare (<i>Uncinula necator</i>) | 0.4 L/HA | 14 |

TEHNICA DE APLICARE



Mystic Top se aplică prin tratamente în timpul vegetației, la avertizare, sau la apariția primelor simptome de boală.

Tratamentele cu **Mystic Top** se pot repeta la un interval minim de 14 zile la cereale, rapiță, măr și viță de vie. Pentru a preveni instalarea rezistenței patogenilor, se recomandă alternarea tratamentelor cu alte fungicide sistematice, având alt mod de acțiune, sau cu fungicide de contact, în funcție de programul de combatere adoptat.

Se folosesc volume normale de soluție la hectar.

