

Detalii Produs

Numere produs :	PRIAXOR EC/(IMPERIS ULTRA-a doua denumire comerciala)
Stare :	Omologat
Grupă de toxicitate :	3
Comentariu (motiv retragere) :	
Tip formulare :	EC - Concentrat emulsionabil
Categorie :	1. Fungicide
Clasă :	K. Amestecuri
Număr cerere, dată:	17944/15130/9459/14146, 28/02/2017
Număr certificat, dată:	273PC, 28/02/2017
Data expirare certificat:	31/05/2026
Detinator(i) omologare:	BASF SE, GERMANIA

Substanțe active

Nume substanță :	Valoare	u.m.
fluxapiroxad	75	g/l
piraclostrobin	150	g/l

Fraze de risc și siguranță

Frază	Categorie
--------------	------------------

Utilizări

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Grau de primavara	Boli	Fuzarioza	1,0 L/ha Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau de primavara	Boli	Fainarea, septorioza, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau de toamna	Boli	Fainarea, septorioza, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau de toamna	Boli	Fuzarioza	1,0 L/ha Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau DURUM	Boli	Fainarea, septorioza, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau DURUM	Boli	Fuzarioza	1,0 L/ha Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau Spelta	Boli	Fainarea, septorioza, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Grau Spelta	Boli	Fuzarioza	1,0 L/ha Se aplica de la mijlocul infracitului pana la sfarsitul	35 zile	-

Orz de primavara	Boli	Fainarea, arsura frunzelor de orz, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infratitului pana la sfarsitul	35 zile	-
orz de toamna	Boli	Fainarea, arsura frunzelor de orz, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infratitului pana la sfarsitul	35 zile	-
Secara	Boli	Rugina, arsura frunzelor	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infratitului pana la sfarsitul	35 zile	-
triticale	Boli	Fainarea, septorioza, patarea reticulara, rugina	0,75-1,0 Se aplica de la mijlocul infratitului pana la sfarsitul	35 zile	-

MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL