REXADE™

Arylex™ Active
Erbicid cu aplicare postemergentă destinat combaterii buruienilor graminee și a unui spectru larg de buruieni cu frunză lată din culturile de cereale de toamnă (grâu, grâu spelta, secară și triticale).

UFI: 068A-Q0GD-C00X-9MGY

GRUP	4+2	ERBICID

Substante active :

Halauxifen-metil Arylex ™	52.1 g s.a./Kg	CAS 943831-98-9
Florasulam	37.5 g s.a./kg	CAS 145701-23-1
Piroxsulam	187.5 g s.a./Kg	CAS 42256-08-9
Cloquintocet acid (safener)	266 g s.a./Kg	CAS 635-476-4

Arylex ™ este marca adoptată a substanței active halauxifen-metil.

Formulare: WG – Granule dispersabile în apă

Omologat în România cu CO nr.: 910PC / 07.03.2024

Deținătorul omologării:
Corteva Agriscience România SRL,
Sat Șindrilița, Comuna Găneasa,
DN 2, KM. 19, Județ Ilfov, România
Tel: +40(0)31 620 4100,

Producătorul:
Corteva Agriscience International Sarl,
Route de Suisse 160, 1290, Versoix, Elveția.
Tel: +41 22 775 36 00.

Tel. De urgență SGS România: +40 744 34 14 53
Ambulanță / Poliție / Pompieri: Tel.112
Centrul de informare toxicologică:
Spitalul Clinic de Urgență București - Calea Floreasca,
Nr. 8, Sector 1, București, Telefon: +4021 5992300.
Telefon de urgență 021 112. (Apelabil permanent 24h/7z).

Lot nr.: a se vedea marcajul de fabrică de pe ambalaj.
Data fabricației: conform cu marcajul de fabrică de pe ambalaj.
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației.

SCAPA

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]:

Pictograme de pericol

GHS08 GHS09 GHS07

Fraze de pericol	
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	
P273	Evitaţi dispersia in mediu.
P391	Colectați scurgerile de produs.
P501	Se va elimina conținutul / recipientul în conformitate cu reglementarea în vigoare.
Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane:	
EUH 401	Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:	
SP1	A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.
SPe3	Pentru protecția organismelor acvatice si a artropodelor neținta, respectați o zonă tampon netratată de 20 m până la apele de suprafață.
EUH 208	Conţine: piroxsulam (ISO). Poate provoca o reacţie alergică.
EUH 210	Fișa cu date de Securitate disponibilă la cerere.

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE!

Atentie: A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare!

MOD DE ACTIUNE

Rexade™- este un erbicid selectiv, cu aplicare postemergentă care combină două moduri de acțiune date de cele trei substanţe active conținute: florasulam, piroxulam şi halauxifen-metil.

Florasulam - este o substanță activă aparținând grupei chimice triazolopirimidine sulfonamide (Grup B, clasificare HRAC, 1,5 triazolo-pirimidin-sulfon-anilide) tip 1care acționează prin inhibarea enzimei acetolactat sintază (ALS), se transloca sistemic în planta inhiband sinteza

aminoacizilor principali ai plantei, ulterior inhiband diviziunea celulara ceea ce duce la moartea speciilor sensibile.
Piroxsulam – este o substanță activă aparținând grupei chimice triazolopirimidine sulfonamide (Grup B, clasificare HRAC, 1,5 triazolo-pirimidin-sulfon-anilide) tip 2 care acționează prin inhibarea enzimei acetolactat sintază (ALS), se transloca sistemic în planta inhiband sinteza aminoacizilor principali ai plantei, ulterior inhiband diviziunea celulara ceea ce duce la moartea speciilor sensibile..
Halauxifen-metil – este o substanță activă aparținând subclasei Arylpicolinate care acționează ca o auxină sintetică (regulator IAA - indole-3- acid acetic)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rexade™ este un erbicid selectiv cu aplicare postemergentă destinat utilizării în culturile de cereale de toamnă (grâu, secară, triticale) destinat combaterii buruienilor graminee și a unui spectru larg de buruieni cu frunză lată. Rexade™ poate fi utilizat și în culturile destinate producerii de semințe.
Nu aplicați erbicidul **Rexade™** pe culturi aflate în condiții de stres precum îngheț, secetă, băltirea apei, carențe de nutrienți, atac puternic de boli și dăunători, etc. Aplicarea erbicidului **Rexade™** in aceste condiții, uneori, poate induce apariția unei ușoare și trecătoare (2-3 săptămâni) îngălbeniri a culturii, fără a avea efecte negative asupra producției obținute.

Nu aplicați erbicidul Rexade™ în cazul culturilor în sistem de culturi intercalate cu cereale (culturi leguminoase – trifoi, sau alte culturi monocotiledonate.)

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Erbicidul **Rexade™** acționează foliar și combate unele buruieni monocotiledonate (graminee) precum: *Apera spica venti* (iarba vântului), *Alopecurus myosuroides* (coada vulpii), *Lolium spp.*, *Avena spp.* (odos), *Bromus spp.* (obsiga) și unele buruieni dicotiledonate anuale (buruieni cu frunză lată) precum:*Fumaria officinalis* (fumăriță), *Lamium spp.* (sugel, urzică moartă), *Matricaria (muşeţel), Veronica spp* (ventrilica), *Stellaria media (rocoină)* și *Papaver rhoeas* (mac).
Pentru o eficacitate mai mare, erbicidul **Rexade™** poate fi aplicat împreună cu un adjuvant.

Cereale de toamnă (grâu, grâu spelta, secară, triticale) : erbicidul **Rexade™** poate fi aplicat de la stadiul de 2 frunze ale culturii (BBCH-12) până la stadiul de 2 noduri ale plantei de cultură (BBCH-32), un singur tratament pe sezon, la doza de:

- **100 g produs/Ha + adjuvant*** pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale (Apera spica-venti – iarba vântului) (*Alopecurus myosuroides* (coada vulpii), *Lolium spp.*, *Avena spp.* (odos), *Bromus spp.* (obsiga)) și a unor buruieni dicotiledonate anuale (*Fumaria officinalis* (fumăriță), *Lamium spp.* (sugel, urzică moartă), *Matricaria inodora (*muşeţel nemirositor*), Matricaria chamomilla* (muşeţel), *Stellaria media* (rocoină*), Papaver rhoeas* (mac) și *Veronica spp* (ventrilica)

Pentru a obține cele mai bune rezultate, se recomandă ca perioadă optimă de aplicare atunci când buruienile sunt într-un stadiu de dezvoltare mic și sunt în creștere activă.

REXADE™– spectrul de combatere:

Cultura	Perioada de aplicare	Buruieni combătute	Doza
Cereale de toamnă (grâu, secară, triticale)	• Postemergent, toamna **sau** primăvara (1 singură dată pe sezon) • De la stadiul de 2 frunze ale culturii până la stadiul de 2 noduri ale plantei de cultură (BBCH 12 – BBCH 32)	*Apera spica-venti* – iarba vântului *Alopecurus myosuroides* (coada vulpii) *Lolium spp.* *Avena spp.* (odos) *Bromus spp.* (obsiga) *Fumaria officinalis* (fumăriță) *Lamium spp.* (sugel, urzică moartă) *Matricaria inodora* (musetel nemirositor) *Matricaria chamomilla* (muşeţel) *Stellaria media* (rocoină) *Veronica spp* (ventrilica) *Papaver rhoeas* (mac))	**100 g/Ha + 0,1%v/v adjuvant Vivolt**

***Pentru a avea o eficacitatea superioară în combaterea buruienilor, recomandarea companiei Corteva este de a se aplica erbicidul Rexade™ împreună cu adjuvantul Vivolt® la doza de 0.1% v/v (doză medie de 250 ml/Ha Vivolt®)**

Atenție! A nu se utiliza în culturile de ovăz și orz!

Erbicidul **Rexade™** poate fi aplicat pe toate tipurile de sol.
Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de stropit este de 100-400 L apă/Ha.
Rexade™ poate fi aplicat la temperaturi cuprinse între 8-25°C. Aplicarea erbicidului poate fi făcută și la 5°C, dar apariția simptomelor de combatere este mai lentă, controlul final al buruienilor nefiind afectat.
Asigurați-vă că buruienile sunt uniform acoperite cu soluția de tratat.
Erbicidul **Rexade™** nu este spălat de ploaie la 1 oră după aplicare.

CULTURI ÎNVECINATE
A se evita pe durata aplicării erbicidului **Rexade™** deriva pe culturile învecinate, deoarece pot apărea fenomene de fitotoxicitate sau chiar distrugerea culturilor sensibile.

- Pentru leguminoase, rapiță și porumb: este necesară o zonă tampon de 5 m, atunci când se utilizează duze standard.
- Pentru toate celelalte culturi: este necesară o zonă tampon de 10 m atunci când se utilizează duze standard, dar poate fi redusă la 5 m când se utilizează duze de reducere a derivei de 50 sau 75%.

A se aplica erbicidul **Rexade™** de preferat în condiții optime – fără vânt sau cu o viteză a vântului egală sau mai mică de 19 km/h, la temperaturi mai mici de 25°C la umbră.

Aplicați erbicidul **Rexade™** numai cu un pulverizator cu braț. Folosiți o presiune de pulverizare cât mai mică posibil și o înălțime a brațului adaptată tipului de duză și vegetației pulverizate, asigurând în același timp o distribuție uniformă a pulverizării. Folosiți duze potrivite pentru aplicarea erbicidelor.

ROTAȚIA CULTURILOR

După aplicarea erbicidului **Rexade™** la doza de 100 g/Ha până la faza de 2 noduri ale culturii, se poate înființa orice cultură după recoltarea culturii tratate.
În caz de cultură calamitată tratată cu erbicidul **Rexade™**, se pot înființa următoarele culturi:

- După minim 4 săptămâni de la tratament: cereale de primăvară, porumb și floarea soarelui.

Atunci când decideți ce cultură să înființați, trebuie luate în considerare de asemenea toate erbicidele utilizate pe suprafața care urmează să fie re-cultivată.

REZISTENȚA BURUIENILOR:

Erbicidul **Rexade™** conține trei substanțe active: halauxifen-metil, pyroxsulam și florasulam, astfel încât riscul de rezistență este redus pentru speciile de buruieni dicotiledonate. Halauxifen-metilul este un arilpicolinat (grupa O, clasificarea HRAC), substanță activă la care riscul dezvoltării rezistenței este considerat scăzut. Piroxsulam şi florasulam sunt substanţe de tip triazolopirimidină (grupa B, clasificarea HRAC) și, ca inhibitori ai ALS (acetolactat sintază), există riscul de dobândire a fenomenului de rezistență la aceste substanțe active, prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție pentru a minimiza acest risc.

Produs	Tip	Substanţa activă	HRAC cod	Risc apariţie rezistenţă
REXADE™ WG	erbicid	halauxifen-methyl	O	scăzut
		pyroxsulam	B	înalt
		florasulam	B	înalt

PREVENIREA APARIȚIEI REZISTENȚEI

Buruieni monocotiledonate

1. Nu aplicați acest produs pe specii de buruieni monocotiledonate cu rezistență cunoscută sau suspectată la erbicidele ALS

2. Pentru a evita apariția fenomenului de rezistență, nu aplicați acest produs sau orice alt produs care conține o substanță activă cu acțiune inhibitoare ALS pentru combaterea buruienilor monocotiledonate mai mult de un tratament la orice cultură

3. Ar trebui adoptate bunele practici agricole, cum ar fi aratul, scarificare adâncă în toamnă, utilizarea unor rate mai mari de semințe și cultivare competitive. Consultați ghidurile locale de rezistență.

4. Utilizați amestecuri de erbicide cu diferite moduri de acțiune la dozele recomandate.

5. Aplicați erbicidele la momentul optim specificat în etichete şi în condiții favorabile de temperatură.

Buruieni dicotiledonate

1. Utilizați dozele recomandate în etichetă pentru a maximiza controlul și a minimiza apariția reinfestărilor.

2. Nu aplicați **Rexade™** la aceeași populație de buruieni de mai multe ori pe an.

3. În zonele în care s-a dezvoltat rezistență la erbicidele ALS la speciile țintă, aplicați **Rexade™** utilizând amestecuri cu erbicide cu un mod de acțiune non ALS.

4. În zonele în care sa dezvoltat rezistența la ALS și erbicide din grupa O, aplicați **Rexade™** ca parte a unui program de combatere integrată.

5. Aplicați erbicidele la momentul optim specificat în etichete şi în condiții favorabile de temperatură.

PREGĂTIREA APARATULUI DE STROPIT ŞI A SOLUȚIEI PENTRU ERBICIDAT

Este important ca echipamentele de pulverizare să fie curate și fără depozite anterioare de pesticide înainte de a utiliza **Rexade™** și apoi curățate corespunzător după aplicare. Urmați procedurile de curățare specificate pe eticheta produsului pulverizat anterior.

Puneți cantitatea necesară de **Rexade™** în rezervorul de pulverizare umplut ¼ la ½ cu apă:

- Umpleți rezervorul cu cantitatea rămasă de apă.
- Mențineți agitatorul în funcțiune în timp ce pulverizați.

Dacă pe lângă **Rexade™**, adăugați un alt produs în rezervorul mașinii de erbicidat, vă rugăm să urmați ordinea recomandată de introducere a produselor în rezervor descrisă la „Ordinea recomandată de amestecare”.

ORDINEA RECOMANDATĂ DE AMESTECARE

Adăugați diferite tipuri de formulări în secvența indicată mai jos. Alocați timp pentru amestecarea completă după adăugarea fiecărui produs.

1. Pungă solubilă în apă (WSB)
2. Granule solubile în apă (SG)
3. Granule dispersabile în apă (WG)
4. Pulbere umectabilă (WP)
5. Suspensie concentrată (SC)
6. Suspensie în capsule (CS)
7. Suspo-emulsie (SE)
8. Dispersie în ulei (OD)
9. Emulsie, ulei în apă (EW)
10. Concentrat emulsionabil (CE)
11. Adjuvanți, agenți tensioactivi, uleiuri

12. Îngrășăminte solubile
13. Retardați pentru evitarea derivei

APLICARE

Rexade™ poate fi aplicat prin pulverizatoare hidraulice montate pe tractor, cu condiția ca acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie calibrate conform recomandărilor producătorului. Tipul de duză nu influențează eficacitatea, iar **Rexade™** poate fi aplicat folosind duze standard și cu drift redus.

SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT.

Pentru a evita prejudiciile din culturile ulterioare, altele decât cerealele, toate echipamentele de stropit trebuie sa fie bine curățate atât în interior, cat și la exterior, după cum urmează:

1. Imediat după pulverizare, goliți rezervorul complet. Orice contaminare, la exterior, ar trebui eliminata prin spălare cu apă curată.
2. Clătiți interiorul rezervorului cu apă curată și cu jet de apă prin duze și furtunuri, folosind cel puțin o zecime din capacitatea rezervorului. Goliți rezervorul complet.
3. Umpleți jumătate rezervorul cu apă curată. Se adaugă agentul de spălare dizolvat in 100 l de apă și agitați scurt. Umpleți cu apă asigurându-vă că rezervorul este complet plin. Agitați pentru 10-15 minute și goliți rezervorul complet.
4. Repetați punctul 2
5. Pentru eliminarea deșeurilor, urmați Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a pesticidelor în ferme și exploatații. A nu se pulveriza pe plante de cultura sensibile sau pe terenuri destinate culturilor sensibile.

MĂSURI DE IGENĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

La manipularea şi utilizarea produsului **Rexade™** este obligatorie folosirea echipamentului complet de protecţie în timpul lucrului de Tip 5-6 (EN 13034): salopetă, mănuşi şi cizme din cauciuc nitrilic, semimască prevăzută cu filtru pentru particule P1 (EN 143) şi ochelari prevăzuţi cu apărători laterale (EN 166). La încărcare folosiţi şorţuri din cauciuc.
Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă la aplicarea produsului:

- Nu inhalaţi vapori sau ceaţă (aerosoli) proveniţi din pulverizare.
- Se vor scoate imediat hainele/echipamentul de protective individual dacă materialul a penetrat în interior.
- Pentru a proteja mediul înconjurător se va scoate şi spăla tot echipamentul de protecţie contaminat înainte de reutilizare.
- Nu aplicaţi acest produs într-un mod în care apare pericolul contaminării lucrătorilor sau altor persoane, direct sau prin derivă.
- Este interzis mâncatul, băutul sau fumatul în timpul lucrului. Spălaţi-vă bine înaintea meselor şi întodeauna după terminarea lucrului.
- Nu deversaţi accidental produsul în apele de suprafaţă sau în sistemul sanitar de canalizare.
- Nu se aplică produsul in aproprierea surselor de apa sau pe alte culturi decât pe cea recomandata.
- Curăţaţi imediat produsul prin aspirare sau măturare în caz de împrăştiere accidentală şi puneţi într-un container adecvat pentru reziduuri.

- Cereţi asistenţă unui specialist, dacă este necesar.

Dacă vă simţiţi rău chemaţi imediat doctorul şi arătaţi eticheta.

PRIMUL AJUTOR

În caz de ingestie administraţi 1-2 pahare cu apă şi cereţi asistenţa medicului să inducă voma sau să facă spălături stomacale. Dacă victima este conştientă, se va clăti gura cu apă. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconştienţă. Cereţi totdeauna ajutorul medicului.

În caz de contact cu pielea, spălaţi cu săpun şi multă apă şi schimbaţi îmbrăcămintea. În cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii se vor ţine ochii deschişi si se spală imediat cu multă apă timp de 15 minute. Consultaţi specialistul dacă iritaţia persistă.

În caz de inhalare scoateţi accidentatul la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială dacă este necesar. Consultaţi medicul după o expunere semnificativă.

În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta dacă este posibil.

Pentru informaţii medicale suplimentare, contactaţi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Nr. Tel. apelabil permanent: +40 21 599 23 00 sau Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Tel. Direct: +40 26 521 01 10; Tel. Centrală: +40 372 653 100: +40 372 683 700; +40 372 683 700; +40 265 212 111.Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.

CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul **Rexade™** trebuie transportat şi depozitat în ambalaj original în locuri uscate şi reci, departe de spaţii locuite, destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii, separat de alimente şi furaje. In timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării transportului şi depozitării se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, etc.

Păstraţi produsele încuiate şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor;

In caz de împrăştiere, strângeţi produsul şi resturile. Deşeurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi păstrate numai în locuri special amenajate, conform legislaţiei în vigoare.

MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Rexade™ nu/este inflamabil. Folosiţi ca agent de stingere: apă, spumă, zăpadă carbonică, produse chimice uscate sau dioxid de carbon. Evitaţi folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de contaminare).

In caz de incendiu, purtaţi mască de respirat cu filtru de aer. Nu inspiraţi fum.

Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică. Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

Pentru incendii mici: Dacă zona este puternic expusă focului şi dacă condiţiile o permit, se va lăsa focul să ardă, deoarece apa poate mări poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă.

MĂSURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

Purtaţi echipament individual de protecţie

Nu contaminaţi cursurile de apă sau sistemul sanitar de canalizare.
Nu permiteţi materialelor să contamineze pânza freatică;
Curăţaţi imediat produsul prin aspirare sau măturare. Folosiţi aspiratoare industriale omologate pentru colectare. Autorităţile locale trebuie să fie înştiinţate dacă sunt scurgeri semnificative care nu pot fi limitate. Dacă produsul contaminează râurile şi lacurile sau canalele, autorităţile trebuie informate. In cantităţi mici: folosiţi materiale absorbante inerte. Utilizaţi containere adecvate pentru stocare şi distrugere. Evitați contaminarea apei cu produs sau cu ambalajul sau.
Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat înapoi în container pentru a fi refolosit.
Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI

Se utilizează un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente suprafețelor de apă.
Pentru evitarea contaminării apelor, produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15m de suprafeţele acvatice. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu deversaţi pe sol sau în subsol. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apa , iar apa rezultată se va adăuga la soluția de stropit. Ambalajele de plastic, inscripționate cu sigla SCAPA, vor fi colectate gratuit prin centre zonale de colectare, in cadrul programului SCAPA. Telefonați la 0800.800.211- număr gratuit sau consultați pagina de internet www.aiprom.ro, pentru informații suplimentare. Nu refolosiți ambalajele goale in alte scopuri.

IN ATENTIA UTILIZATORULUI

Produsul **Rexade™** trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta etichetă.
Producătorul garantează calitatea ridicată a produsului numai dacă este aplicat conform indicaţiilor din această etichetă. Producătorul nu poate verifica păstrarea, mânuirea sau modul de utilizare şi de aceea nu poate fi făcut răspunzător pentru recoltele slabe, pierderile sau oricare alte pagube determinate de păstrarea incorectă, mânuirea, aplicarea sau utilizarea defectuoasă a produsului. Orice abatere de la condiţiile tehnice menționate poate duce la reducerea totală sau parţială a eficacităţii. Utilizatorul îşi asumă toate riscurile în cazul nerespectării recomandărilor. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactaţi reprezentantul autorizat al producătorului în România, Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor sau Serviciile de Carantină Fitosanitară din România.

®™Mărci comerciale ale Corteva Agriscience și ale companiilor afiliate.