



### Date tehnice

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Substanță activă:</b> .....           | 25 g/L imazamox    |
| <b>Formulare:</b> .....                  | Concentrat solubil |
| <b>Număr certificat omologare:</b> ..... | 282PC/28.02.2017   |
| <b>Ambalaj:</b> .....                    | 10L                |



### Caracteristici și mod de acțiune

Fastico® Plus este un erbicid modern care conține, pe lângă substanța activă, numeroase substanțe auxiliare și co-formulanți care îi cresc eficiența prin: retenție mai bună pe frunze, absorbție rapidă, pătrunderea profundă în buruieni.

Datorită acestei tehnologii avansate, substanța activă pătrunde mai ușor și acționează mult mai repede asupra buruienilor, comparativ cu formulările obișnuite.

Fastico® Plus este un erbicid pe bază de imazamox, din grupa imidazolinonelor. Substanța activă este preluată de plante în special prin frunze, dar și prin rădăcini.

Datorită activității reziduale la nivelul solului, produsul Fastico® Plus asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire și a unui nou val de buruieni. Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare. În plantă, substanța activă este preluată până la nivelul zonelor de creștere, unde blochează sinteza aminoacizilor esențiali, responsabili de creșterea și diviziunea celulară. Produsul aparține grupei de erbicide 2 (HRAC).

**Spectrul de activitate:** Fastico® Plus este un erbicid care combate buruienile dicotiledonate, monocotiledonate, precum și *Orobancha spp.* în cultura de floarea-soarelui. Buruieni sensibile: *Abutilon theophrasti*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Chenopodium hybridum*, *Cirsium arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Echinochloa crus-galli*, *Setaria spp.*, *Xanthium spp.*, etc.



### Modul de folosire

#### Cultura

Floarea-soarelui  
– hibridi de tip  
Clearfield® Plus -  
hibridi de tip A.I.R.™

Floarea-soarelui  
- hibridi de tip  
Clearfield®

#### Agentul de dăunare

Buruieni dicotiledonate,  
monocotiledonate,  
*Orobancha cumana*

Buruieni dicotiledonate,  
monocotiledonate,  
*Orobancha cumana*

#### Doză

**1,2 – 2 L/ha postemergent**  
Se aplică la stadiul 2-8 frunze  
ale culturii (BBCH 12-18).

**1,2 - 1,6 L/ha postemergent**  
Se aplică la stadiul de 2-8 frunze  
ale culturii (BBCH 12-18).



### Recomandări

Produsul Fastico® Plus se aplică postemergent, maximum 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12-18, respectiv de la stadiul de 2 și până la 8 frunze ale culturii de floarea-soarelui, iar buruienile la stadiul tânăr de dezvoltare 2-4 frunze. Fastico® Plus poate fi folosit în următoarele

sisteme de producție: Clearfield® Plus, Clearfield® și A.I.R.™

Doza utilizată va fi în funcție de stadiul, spectrul de buruieni și de nivelul de infestare.

Pentru bune practici de utilizare a sistemului Clearfield® Plus la cultura de floarea-soarelui vezi pag. 204.



### Avantaje

- Un produs cu o formulare modernă, patentată.
- Compatibil cu 3 sisteme de producție.
- Asigură flexibilitate în alegerea hibridilor și o combatere mai ușoară a buruienilor.
- Excelent raport calitate/cost.



### Cultura



**Clearfield**  
Sistem de producție pentru floarea-soarelui

**Clearfield Plus**  
Sistem de producție pentru floarea-soarelui

**A.I.R.™**

\*A.I.R.™ este o marcă comercială a unei companii din grupul Syngenta.